

	Classificazione Rivisitata* (Dubin-Solbiati)	Corrispondente alla classificazione secondo Dubin	Classificazione di Solbiati (1995)	Corrispondente alla classificazione secondo Dubin
	B-Mode	Reflusso	Reflusso	
Grado 1	Vasi venosi ectasici (>2.5 mm) a livello della regione inguinale.	Reflusso inguinale solo durante la manovra di Valsalva, della durata <3 secondi	Grado 1	Reflusso inguinale solo durante manovra di Valsalva.
Grado 2	Ectasie venose (>3.0 mm) a livello sopratesticolare.	Reflusso sopratesticolare solo durante manovra di Valsalva, della durata >3 secondi.		Reflusso sopratesticolare solo durante manovra di Valsalva.
Grado 3	Ectasie venose (>3.0 mm) a livello sopratesticolare e peritesticolare.	Reflusso sopra- e peritesticolare a riposo che aumenta durante manovra di Valsalva, della durata >3 secondi	Grado 2	Reflusso peritesticolare solo durante manovra di Valsalva.
Grado 4	Ectasie venose peritesticolari con ulteriore dilatazione durante la manovra di Valsalva; ipotrofia testicolare.	Reflusso peritesticolare a riposo che può aumentare o non aumentare durante manovra di Valsalva.	Grado 3	Reflusso testicolare a riposo che aumenta durante manovra di Valsalva.
Grado 5	Ectasie venose peritesticolari che non si dilatano ulteriormente durante la manovra di Valsalva, o varicocele intratesticolare; atrofia testicolare.	Reflusso peritesticolare a riposo che aumenta minimamente durante manovra di Valsalva o ectasie intratesticolari che mostrano segnale colore durante manovra di Valsalva.		Reflusso peritesticolare a riposo che aumenta minimamente durante manovra di Valsalva.

Tabella 1. La classificazione rivisitata integra la classificazione clinica (Dubin) e quella ecografica (Solbiati) del varicocele testicolare. Modificata da *Scrotal Ultrasound. Morphological and functional atlas. A.M. Isidori, A. Lenzi. Forum Service, 2011, ISBN: 9788889620465